

カネボウ葛根湯 10包

相談する事

- 1 . 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸の弱い人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人 = むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人 = 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 2 . 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合
発疹・発赤、かゆみ、悪心、食欲不振、胃部不快感
 - (2) 1 ヶ月位(感冒、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)
服用しても症状がよくなる場合

- 3 . 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。

製造発売元

カネボウ薬品株式会社
東京都港区海岸 3 - 20 - 20

くすり相談窓口

電話 (03) 5446-3334

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝除く)