

のどぬーる ガラゴック

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 高齢者
 - (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (7) 次の症状のある人 むくみ
 - (8) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

〔皮ふ〕	発疹・発赤、かゆみ
〔消化器〕	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

〔偽アルドステロン症〕	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、
-------------	---

頭痛等があらわれる

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談すること

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること
2. 小児の手の届かないところに保管すること
3. 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
4. 封をあけたら飲みきること、封をあけたまま保存しないこと
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと