

ロート防風通聖散錠 和漢箋 189錠 (医薬品 / ロート製薬株式会社)

### 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。他の瀉下薬 (下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)
  - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
  - (5) 発汗傾向の著しい人
  - (6) 高齢者
  - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - (8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談すること。
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
-------	----

肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる

(2) 1 カ月位（便秘に服用する場合には1 週間位）服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること。
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。下痢

### 保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる）
4. 湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。