

葛根湯 錠剤

使用上の注意

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (8) 次の症状のある人
 排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人
 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

関係部位	症状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる

(2) 一ヶ月位(感冒、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合

保管または取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことが考えられますので、上記の注意を必ず守ってください。
- (5) 本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。